

LAXIT[®] med

Macrogol 4000

10 g

pó para solução oral

Instruções de utilização

Leia atentamente estas instruções de utilização antes da administração de LAXIT[®] MED, pó para solução oral, mesmo que já tenha utilizado este dispositivo médico anteriormente. A informação pode ter sido alterada desde a sua última utilização, de acordo com as investigações científicas mais recentes.

Este dispositivo médico pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, LAXIT[®] MED, pó para solução oral, tem de ser usado com precaução para obter os melhores resultados. Guarde estas instruções, poderá ter de as ler novamente.

LAXIT[®] MED ajuda a melhorar o trânsito intestinal, funcionando naturalmente, sem irritar a mucosa intestinal, sem ser absorvido e sendo eliminado inalterado através das fezes.

Qual é a apresentação do produto?

LAXIT[®] MED é um pó laxante para solução oral. Cada saqueta contém 10 g de macrogol 4000. Não contém quaisquer aromatizantes nem outros excipientes.

Uma caixa contém 2/3/4/6/10/15/20/40 saquetas de dose única.

Em que situações é recomendado?

LAXIT[®] MED é recomendado para o tratamento dos sintomas de obstipação em adultos e crianças com mais de 8 anos.

Como funciona?

Devido à sua afinidade com a água, LAXIT[®] MED suaviza as fezes, facilitando a sua evacuação e proporcionando uma sensação de alívio e bem-estar. Não provoca cólicas nem dor abdominal. A eficácia do produto não diminui quando é utilizado durante um período mais prolongado.

O produto tem efeito 24-48 horas após a administração.

Como é utilizado?

Dissolver o conteúdo de uma saqueta (10 g) em 50-100 ml de água e administrar depois por via oral. O pó pode ser misturado com qualquer bebida, mesmo uma bebida morna, como chá, leite, sumo de fruta ou sopa.

LAXIT[®] MED não altera o sabor da bebida. Recomenda-se a sua administração entre as refeições ou, se for uma dose única, à noite antes de se deitar.

Quais são as recomendações de utilização?

Por ser muito seguro, existe uma grande flexibilidade quanto à dose de LAXIT[®] MED.

Salvo indicação médica em contrário, recomenda-se a administração do dispositivo médico da seguinte forma:

Adultos: ● 1 saqueta 1-3 vezes por dia, dependendo da resposta individual.

Para obter um efeito mais rápido, podem ser tomadas 2 saquetas (20 g de macrogol 4000) como primeira dose única. Em caso de utilização prolongada, a dose pode ser reduzida para 1 saqueta 1-2 vezes por dia, administrada em dias alternados (por exemplo, num dia pode ser administrada 1 saqueta, preferencialmente à noite antes de se deitar, e no dia seguinte pode ser administrada 1 saqueta entre o pequeno-almoço e o almoço e 1 saqueta à noite antes de se deitar).

Crianças: ● mais de 8 anos: 1 saqueta 1-2 vezes por dia.

Não exceda a dose diária máxima.

LAXIT[®] MED deve ser utilizado até que o trânsito intestinal normal esteja restabelecido, mas não mais do que 28 dias consecutivos.

A administração pode ser retomada após um intervalo de 2 dias.

LAXIT[®] med

Macrogol 4000

10 g

pó para solução oral

Quando não utilizar?

Não utilize **LAXIT[®] MED** em caso de hipersensibilidade ao macrogol, doenças inflamatórias intestinais graves (tais como colite ulcerosa, doença de Crohn), megacólon tóxico, perfuração ou risco de perfuração, obstrução intestinal, síndrome de dor abdominal de causa indeterminada.

Durante a gravidez e a amamentação o produto só pode ser utilizado sob orientação médica.

Pessoas com predisposição para perturbações do equilíbrio eletrolítico (por exemplo, insuficiência hepática ou renal) devem utilizar **LAXIT[®] MED** com precaução.

LAXIT[®] MED pode ser associado a medicamentos?

Não existem interações conhecidas com medicamentos, no entanto, recomenda-se que o produto seja administrado com 2 horas de intervalo de qualquer medicamento oral.

Efeitos indesejáveis:

Ocasionalmente, pode ocorrer distensão abdominal e/ou náuseas que desaparecem com a utilização contínua. Muito raros: pode ocorrer eritema (vermelhidão), erupção cutânea ou reações alérgicas graves (reações anafiláticas). Nesse caso, interrompa a utilização e contacte imediatamente o seu médico ou farmacêutico.

O que acontece em caso de sobredosagem?

Pode ocorrer diarreia, que se resolve com a redução ou interrupção da dose (o tratamento pode ser retomado com uma dose inferior).

Quais são as instruções de conservação?



Mantenha fora do alcance das crianças.

ConsERVE na embalagem de origem.

Não são necessárias condições especiais de conservação.

Prazo de validade

Não utilize após o prazo de validade indicado na embalagem.

Dispositivo médico

LAXIT[®] MED, pó para solução oral, é um dispositivo médico de classe IIa de acordo com a Diretiva 93/42/CEE relativa aos dispositivos médicos.

Data da revisão mais recente destas instruções de utilização

Abril de 2023

	Atenção
	Número de lote
	Leia as instruções antes da utilização
	Fabricante
	Prazo de validade
	Não reutilize
	Não utilize se a embalagem estiver danificada e consulte as instruções de utilização
	Distribuidor
	Dispositivo médico



Fiterman Pharma S.R.L.
Str. Moara de Foc nr. 35, 700520, Iasi, Roménia
www.fitermanpharma.ro



Gameiros, Material Clínico, Lda.
Rua da Sismaria, lote 26, Zicofa
2415-809 Leiria
Portugal

MD CE 1936

FITERMAN
PHARMA



Pr LX_{MED}-10g plc-PT-00